




Colonia Dr. Raúl Peña
Distrito de Naranjal
Alto Paraná – Paraguay
Tel. (0672)410068/76/77/78
e-mail: coopena@tigo.com.py
Responsable técnico:
Oscar Frutos – Reg. Prof. 2026
Dr. En Medicina Veterinaria y Zootecnia
Responsable Ventas: Odair Cenci
e-mail: odair.c@coopena.com.py



LINEA CERDOS





Los balanceados Coorpena son producidos para maximizar el potencial de crecimiento de cerdos de faena, y de cerdas para reproducción.

Para eso los balanceados son elaborados con ingredientes de calidad diferenciada.

CERDOS INICIAL



COMPOSICIÓN CENTECIMAL

Proteína bruta	20,00%
Humedad máx.	11,840%
Energía Metabolizable	3,400Mcal./kg
Calcio	0,846%
Fibra bruta	3,40%
Fosforo	0,62%
Extracto etéreo	3,264%

INDICACIONES DE USO

Suministrar ad libitum, siendo dividido en 3 a 4 raciones diarias desde los 30 hasta los 70 días de vida.

CERDOS CRECIMIENTO



COMPOSICIÓN CENTECIMAL

Proteína bruta	17,00%
Humedad máx.	12,00%
Energía Metabolizable	3,268Mcal./kg
Calcio	0,746%
Fibra bruta	4,00%
Fosforo	0,42%
Extracto etéreo	3,264%

INDICACIONES DE USO

Suministrar ad libitum, siendo dividido en 3 a 4 raciones diarias desde los 70 hasta los 120 días (30 y 70 kg/peso vivo).

CERDOS TERMINAL



COMPOSICIÓN CENTECIMAL

Proteína bruta	14,00%
Humedad máx	12,00%
Energía Metabolizable	3,268Mcal./kg
Calcio	0,62%
Fibra bruta	3,19%
Fosforo	0,39%
Extracto etéreo	3,44%

INDICACIONES DE USO

Suministrar a razón de 3% del peso vivo (2,5 a 3kg/día/animal) dividido en 2 raciones diarias desde os 120 días (70kg) hasta la faena.

CERDAS GESTACION



COMPOSICIÓN CENTECIMAL

Proteína bruta	16,00%
Humedad máx.	12,00%
Energía Metabolizable	3,050Mcal./kg
Calcio	0,779%
Fibra bruta	4,40%
Fosforo	0,501%
Extracto etéreo	3,42%

INDICACIONES DE USO

Suministrar para reproductoras desde el destete hasta una semana antes de la parición y animales en reposición, a razón de 2 a 3 kg/día/animal.

CERDAS LACTACION



COMPOSICIÓN CENTECIMAL

Proteína bruta	17,00%
Humedad máx.	12,00%
Energía Metabolizable	3,225Mcal./kg
Calcio	0,950%
Fibra bruta	4,00%
Fosforo	0,530%
Extracto etéreo	3,42%

INDICACIONES DE USO

Indicaciones de uso: Suministrar para hembras reproductoras en lactación a razón de 4 a 7 kg/día/animal, hasta días antes del destete y/o conforme recomendaciones del veterinario.